

Die wehrmedizinische Bedeutung der Poliomyelitis acuta anterior

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde
bei der medizinischen Fakultät
der Universität Göttingen

vorgelegt von

Stabsarzt Hans Felix

aus Dorsten

Göttingen 1940

Dekan: Professor Dr. R. Stich

Referent: Professor Dr. F. Schütz

Tag der mündlichen Prüfung: 11. Dezember 1939

„Wenig ansteckend, aber oft für das ganze Leben entscheidend in ihren Folgen, harmlos für viele Betroffene und daneben wieder vernichtend schlagend, jahrelang unbekannt und plötzlich wieder ein unheimliches Schreckgespenst, weitgehend erforscht und doch jeder menschlichen Abwehr spottend, das ist die spinale Kinderlähmung.“ (Mai).

Diese wenigen Zeilen charakterisieren in treffender Weise die Poliomyelitis und ihre Folgezustände, sie beleuchten grell die Ohnmacht unseres Abwehrkampfes und die Machtlosigkeit unserer Therapie. Unermüdlicher Forscherarbeit blieb bisher der Erfolg versagt, diese die Menschheit seit fast einem Jahrhundert geißelnde Seuche entscheidend bekämpfen zu können.

Erst seit dem Jahre 1840 finden wir Hinweise auf das endemische Vorkommen der Poliomyelitis. Heine war es, der uns ein klares Bild dieses in seinen Auswirkungen furchtbaren Leidens gab und die Poliomyelitis von anderen Hirn- und Rückenmarkskrankheiten abgrenzte. Man muß annehmen, daß vor diesem Zeitpunkt die Krankheit bereits sporadisch, wenn nicht sogar endemisch aufgetreten ist.

Trotz des Hinweises von Heine auf das epidemische Vorkommen fanden in der Folgezeit (1868, 1881) Berichte aus Norwegen, Schweden und Frankreich kaum Beachtung.

Erst durch die in den Jahren 1887, 1895 und 1899 in Schweden und Norwegen auftretenden und von Medin genauer untersuchten Epidemien wurde man aufmerksam. Medin erbrachte den einwandfreien Nachweis des infektiösen Charakters der Krankheit.

Um die Jahrhundertwende finden wir auch Mitteilungen über Herdbildungen in Deutschland und Österreich.

Epidemien größeren Umfanges traten jedoch erst 1905/06 und zwar wiederum in Norwegen und Schweden auf. Der meisterhaften Schilderung der schwedischen Epidemie durch Wickmann verdanken wir die Grundlagen unserer heutigen Kenntnisse über die Epidemiologie dieser Seuche.

Etwas später wurde Amerika von der ersten großen Epidemie heimgesucht.

In Deutschland kam es zu den ersten bedrohlichen Ausbreitungen in den Jahren 1909 und 1911, wobei die Zahl der Erkrankungen auf weit über 1000 geschätzt wird. Nach einer zweiten großen Epidemie in Schweden 1911—1913, deren Beschreibung wir Wernstedt verdanken, traten in neuerer Zeit Epidemien größeren Ausmaßes in Neuseeland, Holland, Belgien, England, Kanada, New York, Rumänien, Dänemark und Kalifornien auf.

Pathogenese :

Eine Poliomyelitis-Krankheit kommt mit Sicherheit nur zustande, wenn dem Virus die Möglichkeit geboten wird, mit neuralen Elementen in Kontakt zu kommen. Die Gelegenheit hierzu ist in erster Linie dann vorhanden, wenn das Virus auf eine schon vorher geschädigte Schleimhaut gelangt. Durch die in diesem Fall freiliegenden Nervenendigungen dringt das Virus in die Tiefe und breitet sich auf neuralem Wege aus. Eine Ausbreitung auf dem Blutlymphwege ist zwar nicht ausgeschlossen, jedoch das Seltenerere. Auf diese Art der Ausbreitung hat besonders Bieling hingewiesen, der behauptete, daß neurotrope Virusarten die Möglichkeit besitzen, von der Blutbahn aus durch Schädigung der Gehirnkapillaren ins Gehirn zu gelangen.

Ähnlich wie die bereits erwähnten Schädigungen der Schleimhäute bei katarrhalischen Erscheinungen der oberen Luftwege, ja auch des Digestionstrakts sind mechanische Ursachen für das Zustandekommen einer Poliomyelitis zu bewerten, wie sie z. B. im Anschluß an einen operativen Eingriff im Nasen-Rachenraum gegeben sind.

Neben dieser rein mechanischen Schädigung nimmt nun Pette fest, daß Zustandekommen der Poliomyelitis-Krankheit eine „akute immunbiologische Umstellung des Organismus im Sinne einer allgemeinen Resistenzminderung“ an. Daß man auch nach plötzlichen klimatischen Umstellungen, starken körperlichen Anstrengungen und seelischen Schäden eine Poliomyelitis unmittelbar folgen sah, spricht dafür, daß hierdurch bedingte Immunitätsschwankungen eine Ausschlag gebende Rolle spielen. Solche Gleichgewichtsstörungen brauchen also nicht alle durch Infekte ausgelöst zu werden. So hält de Rudder an der Möglichkeit fest, daß ein besonderer klimatischer Saisonfaktor im Spiele ist, der die in unseren Breiten gewöhnlichen Spätsommer- oder Herbstgrippe verursacht.

Klinisches Bild:

I. Präparalytisches Stadium.

Selten fehlen im präparalytischen Stadium jene uncharakteristischen Erscheinungen von seiten der Respirationsorgane und des Verdauungstrakts, die in keiner Weise auf eine spätere Erkrankung deuten. Z. N. S. hinweisen. Anginen, Bronchitiden, Erbrechen, Durchfälle, starke Schweiß, Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen und das fast nie fehlende Fieber finden wir auch sonst mehr oder weniger ausgeprägt bei Infektionskrankheiten im Kindesalter. Trotz der Vielseitigkeit der Prodromalerscheinungen gibt es nun aber mehrere Kardinalsymptome, die bei Poliomyelitis fast nie zu fehlen pflegen und auf eine meningitische Reizerscheinung hindeuten. In erster Linie ist es eine allgemeine oder auch örtliche Hyperaesthesie, die in den meisten Fällen nachweisbar ist und die Kinder bei leisester Berührung aufschreien läßt. Vor allem ist dabei eine Überempfindlichkeit des Rumpfes zu bemerken, der unter Vermeidung jeglicher Bewegung auffallend steif und gerade gehalten wird. Anstelle einer Hyperaesthesie können spontane Schmerzen besonders an den unteren Extremitäten im Verein mit Muskel- und Nervendruckempfindlichkeit in den Vordergrund treten. Häufig ist ein

uffallende Schläfrigkeit und Furchtsamkeit am Tage zu beobachten, während die Kinder in der Nacht sehr unruhig schlafen, träumen und schreien. Daneben fehlen Nackenstarre, Erbrechen und Obstipation fast nie. Weniger häufig findet man Harnverhaltungen und starke Schweiß, die an später gelähmten Partien besonders in Erscheinung treten. Klonische Zuckungen und andererseits wiederum Muskelhypotonien wurden beobachtet. Die Bilder des Frühstadiums sind jedoch wechselnd, die Kardinalsymptome können fehlen und oft ist es unmöglich, eine beginnende Meningitis von einem präparalytischen Stadium der Poliomyelitis abzugrenzen (Müller). Lediglich die stets bei einer Poliomyelitis vorhandene Liquorveränderung (Vermehrung der gelapptkernigen im Beginn und später der rundkernigen) vermag die Diagnose zu sichern. Der Zuckergehalt des Liquors pflegt stark erniedrigt zu sein (Abgrenzung gegen Tbc.-Meningitis).

II. Stadium der frischen Lähmungen.

Im unmittelbaren Anschluß an das präparalytische Stadium, seltener nach einem kurzen freien Intervall, treten plötzlich schlaffe Lähmungen auf. In jeder Form, einzeln oder kombiniert, werden sie beobachtet. Meist asymmetrisch, befallen sie in erster Linie die unteren Extremitäten. Jeder quergestreifte Muskel kann befallen werden. Die Lähmung kann sich ganz oder auf einzelne Muskelgruppen des Halses,umpfes und der Arme ausbreiten. Erhöhter Aufmerksamkeit bedürfen Lähmungen der Interkostalmuskulatur.

Eine besondere Verlaufsform bieten die rasch bis zur med. oblongata aufsteigenden Lähmungen, die unter dem Bilde der Landry'schen Paralyse zu lebensgefährlichen Atemstörungen führen und meist tödlichen Ausgang nehmen.

In einigen Epidemien gehäuft wurden rein encephalitische Formen mit Bewußtseinstörungen, soporösen Zuständen, Schlafstörungen und Hyperkinesen beobachtet. Nie traten jedoch spastische Lähmungen auf. Daneben sehen wir Erkrankungen der Hirnkerne, isolierte Facialisläsionen, Okkulomotoriusstörungen, einseitige Abducens, Hypoglossus- und Gaumensegellähmungen isoliert oder im Verein mit spinalen Erscheinungen auftreten. Ausgesprochene Kleinhirnsymptome (ataktische Formen der Poliomyelitis) mit ataktischem Gang, groben Körperzittern und Schwindelanfällen wurden in den letzten Epidemien häufiger als früher angegeben beschrieben.

Die rein meningealen und meist ohne Lähmungen einhergehenden Formen der Poliomyelitis führen leicht zur Verkennung der Ätiologie, es sei denn, daß früher oder später eine Parese irgendeines Muskelgebietes folgt.

Eine Kombination spinaler, meningealer und cerebraler Erscheinungen ist keine Seltenheit.

Auf Beteiligung des Sympaticus weisen im Verlauf der Erkrankung auftretende Störungen der Blasen- und Mastdarmfunktionen (Obstipation, Harnverhaltung) hin.

III. Rückkehr der motorischen Funktionen.

Die Rückkehr der motorischen Funktionen geschieht oft analog dem Lähmungsbeginn über Nacht, meist jedoch ganz allmählich. In umgekehrter Weise wie die Entwicklung der Lähmung sieht man nicht selten die Reparation vor sich gehen. Die Reflexe erscheinen wieder anfangs oft gesteigert, der Tonus der Muskulatur gewinnt an Stärke.

In gelähmten Muskelgruppen dagegen tritt bald eine zunehmende Schlaffheit und eine rasch einsetzende Abmagerung ein. Die atrophische Muskulatur bietet eine ausgesprochene Entartungsreaktion. In den gelähmten Gliedern entwickelt sich bald eine deutliche Untertemperatur, Zyanose, abnorme Schweißsekretion und zeitweise in distalen Abschnitten ein Ödem.

IV. Endstadium.

Die Auswirkungen der Lähmungen sind sehr vielgestaltig, bedingt durch starken Wechsel der Lokalisation und der Ausbreitung, verbunden mit Rückwirkung auf Haut, Muskulatur, Knochen und Gelenkapparat. Vasomotorisch-trophische Störungen führen zu Veränderungen der Haut, die leicht verwundbar ist und schlechte Heiltendenz zeigt. Die Atrophie der Muskulatur kann so vollständig sein, daß die betroffene Extremität nur noch aus Haut und Knochen besteht. Andererseits kommt es durch reaktive Fett- und Bindegewebswucherungen oder hämorrhagische Ödeme zu Pseudohypertrophien. Nur teilweise gelähmte Muskelgruppen zeigen vermindertes Wachstum mit in der Folgezeit auftretender kompensatorischer Hypertrophie benachbarter Gruppen.

Stärkere Extremitätslähmungen verursachen durch Schwerpunktverlagerung Verbiegungen der Wirbelsäule; in gleicher Weise wirken sich einseitige oder doppelseitige Lähmungen der Rumpfmuskulatur aus. Oft sind beide Momente kombiniert. Schiefhals, Lendenlordose, Kyphoskoliosen, Verkürzung und Verbiegung der gelähmten Extremitäten durch Funktionsausfall und vasomotorisch-trophische Störungen sind u. a. die Resultate der Erkrankung. Es entstehen Schlottergelenke infolge Erschlaffung der Gelenkbänder und Schwinden der Gelenkknorpel. Schrumpfungsvorgänge der gelähmten Partien im Verein mit Verkürzung der intakt gebliebenen Antagonisten führen bald zu Verbiegungen der Knochen, Überdehnung der Gelenke, zu Klump- und Spitzfußstellungen. Die Rückwirkungen der Lähmungen verursachen umfangreichere Verunstaltungen des Skeletts, je früher die Krankheit den Körper befallen hat.

Abortive Erkrankung:

Mehr oder weniger flüchtige, dem paralytischen Stadium ähnelnde Bilder mit Fieber, Nackensteifigkeit, Kopfschmerzen, Anginen, Durchfällen usw. pflegen innerhalb weniger Tage völlig zurückzugehen. Oft besteht nur eine geringe Unpäßlichkeit, ein Schnupfen, ein leichter Husten oder Symptome, die einer Grippe ähneln. Nach Abklingen dieser meist flüchtigen Erscheinungen entgehen dem oberflächlichen Beobachter leider meist geringfügige Muskelschwächen, leichte Ataxie, Fehlen der Sehnenreflexe usw., Symptome, die den spezifischen Charakter

er vorausgegangenen Krankheit erkennen lassen. Auf einen typischen Fall von Poliomyelitis rechnet man sehr viel mehr abortive Fälle, deren Zahl von manchen Autoren auf das 50—100fache angegeben wird.

Pathologisch-anatomischer Befund:

Pathologisch-anatomisch finden wir im präparalytischen Stadium einen völlig intakten Ganglienzellenapparat, während man regelmäßig mesodermalglöse Infiltrate im Hirnstamm, den Kerngebieten und dem Gehirn antrifft (Pette). Diese Infiltrate, verbunden mit kollateralem Ödem sind die Ursache der im akuten Stadium der Erkrankung meist beobachteten Erscheinungen, wie Schlafbedürfnis, Hyperaesthesien, abnorme Schweißbildung usw. Erst im Stadium der Lähmung sind die der motorischen Funktion dienenden Elemente des Rückenmarks von dem Virus befallen. Parenchymale Veränderungen werden entsprechend den klimatischen Erscheinungen auch im verlängerten Mark und Hirnstamm befunden. Eine gleichzeitige Erkrankung verschiedener Rückenmarksegmente trifft man nie an, vielmehr sieht man im gleichen Segment alle „Übergänge von einer einfachen Schädigung im Sinne einer akuten Ganglienzellenerkrankung Nissel's bis zur völligen Auflösung“. (Pette).

Die einmal völliger Zerstörung anheimgefallenen Ganglienzellen sind natürlich einer Regeneration nicht fähig. Die klinisch in Erscheinung getretene Lähmung bleibt bestehen, während die nur akut erkrankte Zelle ihre volle Funktionstüchtigkeit wieder erlangen kann. Entsprechend verhält sich auch das klinische Bild.

Prophylaxe und Therapie:

Sie haben bisher zu keinem positiven Ergebnis geführt. Bei kritischer Auswertung aller bis heute angegebenen Maßnahmen, sei es die prophylaktische Zinksulfatbehandlung der Nasenschleimhaut, die aktive oder passive Immunisierung, die Pyrikerbehandlung ohne die übrigen in nicht geringer Zahl angepriesenen Methoden, kommt man leider zu der Erkenntnis, daß es keine Behandlungsweise gibt, von der man eine zuverlässige Vorbeugung vor der Erkrankung, eine Abschwächung des Krankheitsverlaufs oder gar einen wirksamen Schutz vor dem tödlichen Ausgang erwarten könnte. Das Wenige, das wir prophylaktisch tun können, ist neben allgemeinen Abwehrmaßnahmen in Epidemiezeiten die Vermeidung aller Schäden (körperliche Überanstrengung, plötzliche klimatische Umstellungen, Diätfehler, Erkältungen, Mandelausschälungen), die imstande sind, eine Immunitätsschwankung des Körpers zu begünstigen und so einer latenten Infektion die Tore zu öffnen.

Epidemiologie:

Wie die eingangs aufgeführte kurze historische Skizze zeigt, ist die Poliomyelitis eine Krankheit der gemäßigten und besonders der äquatornächsten Zonen (de Rudder). In äquatornahen Ländern fehlt die Poliomyelitis fast völlig und in Deutschland spielt sie beispielsweise nicht die Rolle, wie in den skandinavischen Ländern.

Ferner ist charakteristisch für die Poliomyelitis, daß ihr epidemisches Auftreten vorzugsweise in die Spätsommer- und Herbstmonate fällt, während, von Ausnahmen abgesehen, in der übrigen Jahreszeit meist nur ein sporadisches oder endemisches Auftreten beobachtet wird.

Neben der jahreszeitlichen Bindung des epidemischen Auftretens tritt der rapide Anstieg der Erkrankungsziffern innerhalb einer kurzen Zeitspanne und ihr ebenso steiler Abfall auffallend in Erscheinung. Diese sogenannte steile Jahreszeitenwelle der Poliomyelitis erreicht ihren Gipfel im August und September, wobei ein Abweichen von diesem Spätsommerngipfel nur vereinzelt zur Beobachtung kam. So lag beispielsweise der Gipfel einiger Epidemien bereits im Juli und der Rückgang vollzog sich im August, also zu einem Zeitpunkt, der sonst für den Anstieg der Erkrankung charakteristisch ist. Eine gewisse Temperatur ist anscheinend für das Zustandekommen nicht erforderlich, doch auch im Winter verschiedentlich kleine Epidemien entwickelt haben.

Die Tatsache, daß große Epidemien bisher fast ausnahmslos an die Sommer- und Herbstmonate gebunden waren, scheint dafür zu sprechen, daß gewisse jahreszeitlich klimatische Faktoren neben erhöhter Virulenz des Erregers und einer Resistenzminderung der Bevölkerung eine ausschlaggebende Rolle spielen. Ein einwandfreier Beweis hierfür liegt nicht vor, doch wurde in Jahreszeiten, in denen die Poliomyelitis selten auftritt, beobachtet, daß die präparalytischen Erscheinungen mit einer Kaltfront und die darauf folgenden Lähmungen mit einer neuen Kaltfront zusammenfielen. (de Rudder).

Dem in der Natur weit verbreiteten Virus sind eine Unzahl von Menschen ausgesetzt und dennoch erkranken in typischer Weise nur wenige und zwar in erster Linie Kinder. Von dem Gesichtspunkt der großen Anfälligkeit der Kinder aus gesehen, ähnelt die Poliomyelitis der Diphtherie und den Masern. Die Erkrankungsbereitschaft ist aber trotz großer Empfänglichkeit im Vergleich zu den übrigen Infektionskrankheiten des Kindesalters nur sehr gering.

Die Tatsache, daß wir relativ wenig Kinder und nur ganz selten Erwachsene in typischer Weise erkrankt sehen, findet ihre Erklärung darin, daß die Mehrzahl der Bevölkerung schon in früher Jugend eine atypische, abortive oder sogar stumme Infektion durchmacht, die sie gegen eine Wiedererkrankung in den meisten Fällen für das ganze Leben schützt. Bewiesen wurde diese Annahme durch eingehende Untersuchungen von Kramer und Aycock, die den Antikörpergehalt des Blutes einer Reihe von Menschen verschiedener Altersklassen und verschieden dicht besiedelter Gebiete untersuchten und dabei fanden, daß

1. Erwachsene aus dichter Besiedlung häufiger Immunstoffe aufweisen, als dieselben Altersklassen aus weniger dicht besiedelten Gebieten
2. der Antikörpergehalt zum Spiel- und Säuglingsalter hin rapid abnimmt und
3. die Immunisierung der Bevölkerung zu Epidemiezeiten besonders hoch ist, aber auch in epidemiefreien Zeiten erfolgen kann.

Der Grund für die häufigere Immunität der Stadtbevölkerung findet seine Erklärung in der größeren Kontaktwahrscheinlichkeit. Die Mehr

ahl der Menschen kommt hier schon in früher Jugend mit dem Virus in Berührung und macht so eine „natürliche Schutzimpfung“ (Pfaundler) durch. Erhöhte Kontaktwahrscheinlichkeit führt gleichzeitig dazu, daß eine Verschiebung der Morbidität vom Erwachsenen nach dem Kindesalter hin erfolgt, ein Vorgang, der von de Rudder mit milieubedingter Durchseuchungspräzession bezeichnet wurde.

Die mit Abnahme der Bevölkerungsdichte parallel abwärts laufende Kontaktwahrscheinlichkeit hat eine geringere Durchseuchung zur Folge. Als Beweis hierfür finden wir auf dem Lande weniger Immune, dagegen umso mehr Krankheitsbereite, deren Durchschnittsalter naturgemäß höher ist, als in der Stadt.

Diese Tatsache erklärt die immer wieder gemachte Beobachtung, daß Epidemien auf dem Lande eine relativ hohe Morbidität aufweisen und die Krankheitsfälle sich nicht in dem Maße wie in der Stadt auf die jungen Jahrgänge zusammendrängen. Das mittlere Erkrankungsalter liegt also auf dem Lande höher als in der Stadt.

Ferner spricht die Aussparung früherer Epidemiebezirke bei folgenden Epidemien dafür, daß es zu einer Immunisierung der Mehrzahl der Bevölkerung gekommen sein muß. Erst durch Nachwuchs empfänglicher Individuen können einer neuen Epidemie die Tore geöffnet werden. Je länger eine Bevölkerung verschont bleibt, umso größere Ausmaße nimmt die nachfolgende Epidemie an. Die Folgen eines gänzlich fehlenden Kontaktes mit dem Erreger offenbaren sich am besten, wenn die Infektion in Bevölkerungen eindringt, der sich bisher keine Gelegenheit zur Immunisierung bot. So beobachtete man bei Inselbewohnern eine Morbidität von nahezu 30%.

Neben diesen Vorgängen scheinen Virulenzschwankungen des Erregers eine nicht unbedeutende Rolle zu spielen. Vielleicht sind nach einer Epidemie erst eine Anzahl von Passagen erforderlich, um dem Virus seine alte Kraft gewissermaßen wiederzugeben.

Als Ausdruck für diese Virulenzschwankungen wird der Wechsel von Morbidität und Letalität angeführt, der in den einzelnen Epidemien sehr verschieden ist. Aber nicht nur der Wechsel von Morbidität und Letalität, sondern auch die Verschiedenheit in der Schwere der Lähmungen einerseits und die Häufung leichter Fälle andererseits in verschiedenen Epidemien ist als Beweis für Virulenzschwankungen des Erregers anzusprechen.

Das Krankheitsbild der Poliomyelitis offenbart sich immer wieder in anderer Form und ein Zurückgehen der Schwere der Erscheinungen ist bis heute noch nicht erwiesen.

Schließlich leistet eine zu gewissen Zeiten auftretende, sowohl durch klimatische Einflüsse bedingte, als auch durch eine Reihe anderer noch zu erörternder Faktoren verursachte Resistenzminderung der Bevölkerung dem Zustandekommen der Erkrankung Vorschub.

Eine besondere Disposition zur Erkrankung scheinen gewisse Konstitutionstypen zu besitzen. Müller sah in erster Linie besonders „kräftige und feste“ Kinder erkranken.

Auf eine gewisse ererbte Empfänglichkeit für die Erkrankung weist die Beobachtung über gehäuftes Auftreten in derselben Familie in verschiedenen Generationen und zu verschiedenen Zeiten hin.

Auch ist eine Rassendisposition nicht ganz von der Hand zu weisen. So fand man im Süden der Vereinigten Staaten, daß Weiße eine größere Anfälligkeit besaßen als Neger. (R. Paul).

Endlich sollen Individuen der Blutgruppe O eine erhöhte Erkrankungsbereitschaft besitzen.

Die vorhin erwähnten, zur Herabsetzung der Widerstandskraft führenden und dadurch das Zustandekommen der Erkrankung begünstigenden Faktoren seien kurz angeführt. Es ist leider noch zu wenig bekannt, daß vorausgehende Krankheiten, operative Eingriffe, körperliche Anstrengungen und psychische Traumen in Epidemiezeiten in der Lage sind, der Erkrankung die Wege zu ebnen, eine latente Infektion zu einer manifesten zu machen, kurz die Disposition zur schweren Erkrankung zu fördern. Beispiele hierfür liegen in genügender Zahl vor. Man beobachtete Beziehungen zwischen Mandelausschälungen und Poliomyelitis. Man sah eine Anzahl von Soldaten kurz nach einer anstrengenden Felddienstübung erkranken. In einem Internat erkrankten schlagartig in erster Linie Schüler, die an mehreren Sportfesten teilgenommen hatten, wobei hervorzuheben ist, daß Erkrankungen am Ort selbst oder am Ort der sportlichen Betätigung nicht zu verzeichnen waren.

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist das gehäufte Vorkommen von Poliomyelitis in Sommerfrischen. Die Anstrengungen einer Reise oder noch mehr die mit einem Klimawechsel verbundene Umstellung des Organismus fördern die Erkrankungsbereitschaft.

Von anderer Seite wird auf das gehäufte Vorkommen der Poliomyelitis in denselben Häusern hingewiesen und dazu aufgefordert, der Rolle des Bodens bei der Seuchenentstehung der Poliomyelitis größere Beachtung zu schenken. Wenn man sich vor Augen hält, daß nicht nur im Nasen-Rachen-Sekret, sondern auch im Stuhle Erkrankter Poliomyelitis-Virus gefunden wurden, so besteht die Forderung zu Recht, den Boden und schadhafte Abortanlagen solcher Poliomyelitis-Häuser zu untersuchen.

Die Verbreitung des Virus, verbunden mit seiner größten Widerstandskraft äußeren Einflüssen gegenüber hat zur Folge, daß praktisch jeder einmal mit dem Erreger in Berührung kommt. Man hat auch im Nasen-Rachen-Sekret scheinbar Gesunder den Erreger nachweisen können und diese gesunden Keimträger in erster Linie für die Verbreitung des Virus verantwortlich gemacht. Erst in zweiter Linie sind es die abortiven Fälle, deren Zahl auf ein Vielfaches der typischen Erkrankten angegeben wird, die für die Ausbreitung der Erkrankung am geschuldigt werden müssen.


Die Mehrzahl macht aber weder eine typische noch abortive Erkrankung durch, sondern nimmt den Erreger auf, ohne in irgendeiner erkennbaren Weise darauf zu reagieren. Der einzige Ausdruck dieser stillen Infektion ist die Immunität, die ihn scheinbar für immer schützen kann.

Das Vorkommen der Poliomyelitis in Deutschland seit 1925.

Im Anschluß an die erste Epidemie im Jahre 1909 folgten Epidemien gleichen bzw. unbedeutend größeren Ausmaßes in den Jahren 1913, 1915, 1918 und 1924, ohne daß in der Zwischenzeit die Kette der Epidemien unterbrochen wurde.

Die Zahl der Todesfälle schwankt in diesem Zeitraum jährlich zwischen 50 und 150. Bemerkenswert für die Epidemie 1915 ist das gleichzeitige Auftreten der Diphtherie-Epidemie, die mit weit über 22 000 Todesfällen fast die Mortalität von 1900 erreichte, und die Epidemie des Jahres 1918, die wiederum einen Begleiter in der zum gleichen Zeitpunkt grassierenden Grippe-Epidemie fand. Wahrscheinlich ist, daß bei dieser Epidemie eine Unzahl von abortiven Poliomyelitis-Fällen unter der Diagnose einer Grippeerkrankung segelten und sich bei besserer Kenntnis der Poliomyelitis die Statistik zu Ungunsten derselben geändert hätte. Man könnte annehmen, daß zu dieser Zeit die Resistenzminderung der Bevölkerung, die stille Feiung gegenüber abortiven und atypischen Erkrankungen zurücktreten mußte. Für die Annahme einer nur teilweise erkannten Poliomyelitis-Epidemie spricht das große Intervall von 6 Jahren bis zum Auftreten einer neuen Epidemie im Jahre 1924. Trotz des rapiden Anstiegs der Geburtenziffern in den Jahren 1919 und 1920 und der damit Hand in Hand gehenden Zunahme Erkrankungsereignisse kam es aber nur zu begrenzten Epidemien, obwohl das heimkehrende Heer, die Besetzung großer Gebiete durch fremde Truppen, die Zunahme des sozialen Elends einerseits und die ins Groteske gesteigerte Vergnügungssucht andererseits neben der durch all diese Faktoren bedingten seelischen Zerrüttung der Bevölkerung wahrhaftig dem Zustandekommen einer gewaltigen Epidemie den Boden hätte bereiten können, wäre nicht das Virus vorwiegend auf Gefeierte gestoßen.

Die Mortalitätskurve der Poliomyelitis (Abb. 1) steigt vom Jahre 1911—1923 flach und fast gleichmäßig an, erreicht im Jahre 1924 nicht einmal die Zahl von 200 Todesfällen, um im Jahre 1925 wieder steil abzufallen. Erst die Jahre 1926 und 1927 zeigen ein rapides Ansteigen mit einem Gipfel von fast 3000 Erkrankungen im Herbst 1927. Der Abstieg erfolgt in typischer Weise im folgenden Jahr, ohne daß jedoch die Kurve ihren Ausgangspunkt wieder erreicht, d. h. die Erkrankung nimmt von einer neuen höheren Basis aus ihren Fortgang und kehrt nicht wie in früheren Jahren zu dem Wert zurück, von dem sie durchweg bisher ihren jeweiligen Anfang nahm. Im weiteren Verlauf der Kurve sieht man, daß die Gipfel der einzelnen Poliomyelitis-Wellen fast gleichmäßig ansteigen und ihren Ursprung von einem ebenfalls steigenden Ausgangswert nehmen. Mit jeder Epidemie wächst der Gipfel im Mittel um das 4fache und erreicht dabei durchschnittlich das fünffache seines Ausgangswertes. So sieht man diese Gipfel im Jahre 1932 mit 4000 und 1938 mit 5800 Erkrankungen. Teilweise erheblichen Schwankungen in den einzelnen Epidemien ist die Letalität ausgesetzt. Während sie 1925 2% betrug, sehen wir sie im folgenden Jahre bereits auf 10% sinken. 1927 und 1928 steigt sie zwar wieder auf 12,4 bzw. 15% an, um dann von Jahr zu Jahr, merkwürdigerweise im Gegensatz zum Anstieg der Morbidität zurückzugehen. So sinkt die Letalität in den beiden größten



Epidemien Deutschlands auf 9% im Jahre 1938 und auf 8,4% im Jahre 1932 ab.

Die der Abb. 2 zugrunde liegenden Zahlen geben einen Überblick über die seit 1925 gemeldeten Erkrankungen an spinaler Kinderlähmung auf 100 000 der Bevölkerung. Die Darstellung läßt die von Epidemie zu Epidemie steigende Zahl der Erkrankten erkennen, zeigt die Häufigkeit der Poliomyelitis in den einzelnen Reg.-Bezirken und Ländern und stellt die Beziehungen zwischen Erkrankungshäufigkeit und Bevölkerungsdichte klar heraus. Man sieht, daß sich die Morbidität in weniger dicht besiedelten Gebieten fast gleichmäßig auf die einzelnen Jahre verteilt und innerhalb der großen Epidemien 1927, 1932 und 1938 nur unwesentlich ansteigt, während in dicht besiedelten Gebieten ein deutliches Ansteigen der Morbidität in den Jahren 1926, 1927, 1931, 1932, 1937 und 1938 nicht zu verkennen ist.

Ferner fällt auf, daß eine ausgesprochen hohe und in keinem Verhältnis zu den Erkrankungsziffern stehende Morbidität in den 14 aufgeführten Jahren nur einmal erreicht wird. Beispiele hierfür sind (1938) Köln, Unterfranken, Schwaben, Chemnitz, Württemberg, Koblenz, Wiesbaden. 1932 sind es Stettin, Schneidemühl, Magdeburg, Hildesheim und Mecklenburg, die auffallend hoch beteiligt sind und weder in den Jahren vor- noch nachher auch nur annähernd diese Zahlen wieder erreichen. Leipzig und Merseburg weisen 1927 Ziffern auf, die sich bis heute in diesen Gebieten noch nicht wiederholt haben.

Zu den Beziehungen zwischen Bevölkerungsdichte und Erkrankungshäufigkeit in den letzten 14 Jahren ist zu bemerken, daß sich die Morbidität mit gleicher Häufigkeit in dünnsten wie in dichtesten Siedlungsgebieten Deutschlands über den Reichsdurchschnitt bewegt. Auffallend ist jedoch, daß die Großstädte Berlin, Köln, Hamburg, Bremen, Lübeck und Chemnitz besonders hohe Durchschnittsziffern aufweisen, während sich mitteldicht besiedelte Räume meist erheblich unter dem Durchschnitt halten.

Was an der Epidemie des letzten Jahres noch auffällt, ist die Tatsache, daß das gesamte der Westgrenze benachbarte Gebiet eine bis dahin nicht erreichte Morbidität aufweist, obwohl in einem Teil der in Frage kommenden Gebiete in den vorausgehenden Jahren bereits nicht unerhebliche Erkrankungsziffern aufgetreten waren. Gleichzeitig sieht man, daß an der Ostgrenze Sachsen mit Chemnitz, Leipzig, Dresden und Bawickau an der Summe der Erkrankungen im ganzen Reich nicht gering beteiligt ist.

Man ist geneigt, anzunehmen, daß die an beiden Grenzen sich abspielenden Vorgänge, vielleicht im Verein mit dem Einbruch eines besonders virulenten Erregers, beim Zustandekommen der Epidemie eine ausschlaggebende Rolle gespielt haben. Erkrankten in den Jahren 1925 bis 1931 von 100 000 Menschen im Durchschnitt nur 2,2%, so sehen wir diese Zahl sich in dem Zeitraum von 1932—1938 bereits verdoppeln. Dabei beträgt die Morbidität für den gesamten Zeitabschnitt 3,2 auf 100 000 der Bevölkerung.

Eindringlicher werden diese Zahlen, wenn wir der Betrachtung diejenigen Altersklassen zugrunde legen, die der Erkrankung in erster Linie anheimfallen. (Abb. 3). Bekanntlich befällt die Poliomyelitis vor-

zugsweise das Spielalter. Die Zweijährigen erreichen den Gipfel der Morbidität. Zum Schulalter hin sinkt sie bereits beträchtlich ab. Denoch liegen 50 % der Erkrankungen vor Beginn der Einschulung (H. Müller) und 90 % aller Poliomyelitis-Fälle befallen die Kinder bis zu 10 Jahren.

Von dieser Tatsache ausgehend habe ich die Erkrankungshäufigkeit der Kinder unter 10 Jahren errechnet, wobei ich mir bewußt bin, daß die erzielten Resultate im Durchschnitt etwa 8—10 % zu hoch angegeben sind. Das so erreichte Bild gibt aber einen besonderen Einblick in die Häufigkeit der Erkrankung der gefährdeten Altersklassen.

Während die Morbidität der Zweijährigen mit 0,35 % und die der Sechsjährigen mit 0,15 % (H. Müller) angegeben wird, fand ich für die 0—10-jährigen in der Zeit von 1925—1938 eine durchschnittliche Erkrankungshäufigkeit von 0,02 %. Von 10 000 Kindern erkrankten also pro Jahr durchschnittlich 2, eine Zahl, die in den Jahren 1927, 1933, 1936 und 1937 und besonders 1938 z. T. mehr als verdoppelt wird. Über ein Vielfaches überschritten wird dieser Durchschnitt von denjenigen Regierungsbezirken und Ländern, in denen bisher die Seuche am heftigsten wütete. Bereits 1926 erkrankten in Lübeck 10 von 10 000 Kindern, 1927 sind es in Merseburg schon 11 und in Leipzig sogar 21. In den folgenden Jahren werden solche Ziffern auch nicht annähernd wieder erreicht. Erst die Epidemie des Jahres 1932, die vorwiegend die Regierungsbezirke Preußens heimsucht, weist etwa gleiche Werte auf. Dabei fällt auf, daß die Anzahl der befallenen Bezirke bereits auf das Dreifache gestiegen ist. In Hannover und Hildesheim, Stettin und Schneidemühl, Magdeburg und Bremen sehen wir erschreckend hohe Morbiditätsziffern. Im ganzen Reiche erkrankten in diesem Jahre von 10 000 Kindern 3,7 % und Preußen erreichte den bis heute höchsten Durchschnitt von 4,1 %.

Dieser gewaltigen Epidemie folgt das typische freie Intervall, in dem nur ganz selten der Reichsdurchschnitt überschritten wird. Doch schon in den beiden folgenden Jahren beginnen die Zahlen wieder zu wachsen und abermals ist es Lübeck, das nach 8-jährigem Intervall erneut eine Morbidität von 10,0 erreicht. 1936 sind es Bremen und Schaumburg-Lippe, die mit 10 bzw. 21 Erkrankungen als die größten Epidemiebezirke dieses Jahres hervortreten. Bereits im nächsten Jahre wächst der Reichsdurchschnitt, hervorgerufen durch die große Epidemie in Oberbayern, während im übrigen Reich, abgesehen von Berlin, keine außergewöhnlichen Zahlen zu verzeichnen sind.

Ungeahnte Ausmaße dagegen erreicht die Epidemie des Jahres 1938. Die durchschnittliche Erkrankungshäufigkeit im Reiche steigt rapide auf über das Doppelte des Vorjahres. Über fast alle Teile des Reiches sehen wir die Krankheit verbreitet, und nur wenige, meist isolierte Gebiete, bleiben verschont. Von 10 000 Kindern fallen in Wiesbaden 12, in Chemnitz und Unterfranken je 16, in Württemberg 21 und in Köln sogar 33 der Poliomyelitis anheim.

Im jahreszeitlichen Ablauf der einzelnen Poliomyelitis-Wellen machen z. T. nicht unerhebliche Abweichungen sich bemerkbar. Während gewöhnlich die ersten Anzeichen einer beginnenden Epidemie in der 28.—30. Woche deutlich werden, der Gipfel Ende August bis Anfang September erreicht wird und der Rückgang sich in gleicher Weise voll-

er Anstieg vollzieht, sehen wir 1934 den Termin auf die 33. Woche, d. h. auf Mitte August, verschoben. Diesem späten Termin entsprechend folgt der Gipfel erst in den letzten Tagen des September, von dem aus er langsam abfallend sich die Epidemie bis Anfang Dezember hinzieht.

1935 erreicht die Poliomyelitis-Welle nach einem verhältnismäßig langen Anstieg von 11 Wochen erst mit Beginn des letzten Jahresviertels ihren Höhepunkt, um dann innerhalb von 7 Wochen zu ihrem Ausgangswert zurückzukehren. Den zeitlich gleichen Ablauf erleben wir im folgenden Jahre. Auch hier vollzieht sich nach tragem Anschwellen die Rückkehr zur Norm sehr schnell.

1937 beginnen die Krankheitsfälle sich noch früher zu häufen. Von der 26. Woche ab steigen die Ziffern langsam aber stetig an und erreichen trotz des frühen Beginns erst Mitte September ihr Maximum, dem ein zunächst rapider Abfall folgt. Dann allerdings ist 5 Wochen lang ein weiterer Rückgang der Krankheitsziffer nicht zu bemerken. Erst zu Beginn der 44. Woche flaut die Epidemie merklich ab, um schließlich Anfang Dezember zu erlöschen.

Die bis heute in Deutschland weitaus größte Epidemie des Jahres 1938 ist nicht allein ihrer enormen Ausmaße wegen bemerkenswert, sondern hervorzuheben ist in erster Linie der Ablauf des über ein halbes Jahr sich hinziehenden Geschehens. Noch vor Beginn der zweiten Jahreshälfte mehren sich die Krankheitsfälle, ohne jedoch in den folgenden 6 Wochen nennenswert anzusteigen. Dann allerdings setzt die Epidemie mit einer bis dahin nicht gekannten Wucht ein. Von Woche zu Woche steigen die Ziffern von 95 auf 165, von 165 auf 365, bis Anfang September der Höhepunkt mit 416 Poliomyelitis-Kranken erreicht ist.

Hatte man nun mit einem dem Emporschießen der Seuche analogen Rückgang gerechnet, so wurde man bitter enttäuscht. Bis weit in den Oktober hinein werden wöchentlich 350—380 Neuerkrankungen gemeldet und erst die letzten Tage dieses Monats lassen die Hoffnung auf ein allmähliches Nachlassen der Epidemie aufkommen. Doch selbst im letzten Drittel des November sind noch über 150 Kranke zu beklagen, und erst im Dezember flaut die Epidemie ab. Immerhin werden in der 50. Woche des Jahres noch 74 neue Fälle gezählt, während die darauffolgende Weihnachtswoche ein erneutes, allerdings letztes Emporschnellen auf 132 Neuerkrankungen mit sich bringt. Erst die letzte Woche des Jahres läßt das endgültige Versiegen der Epidemie erkennen, die nach $1\frac{1}{2}$ jähriger Dauer mit einer bis dahin unerreichten Zahl von fast 6000 Erkrankungen und 527 Todesopfern abschloß.

Dieser Rückblick auf die Entwicklung der Poliomyelitis-Morbidität in den letzten 14 Jahren zeigt, daß die Erkrankungsziffern trotz zeitweiligen Rückgangs stetig und steil angestiegen sind und in den letzten Jahren Zahlen erreichten, die stärkste Befürchtung für die Zukunft erwecken. Eine so hohe Erkrankungszahl bedeutet für viele Hunderte den Tod, für Tausende aber lebenslängliches Krüppeltum und soziales Elend. Gerade dieser Umstand läßt einen Vergleich der Poliomyelitis-Morbidität mit den Mortalitätsziffern der übrigen Infektionskrankheiten des Kindesalters zu (Abb. 1). Man sieht wie die Poliomyelitis zunächst nur die Kurve des Scharlachs und der Diphtherie überschneidend 1932 auch die Mortalität der Masern und des Keuchhustens weit übertrifft,

um schließlich sogar die Diphtherie-Mortalität von 1930 zu übersteigen. Ein eindrucksvoller Beweis für die zunehmende Bedeutung der Kinderlähmung im Rahmen der wichtigsten Infektionskrankheiten des Kindesalters.

Die Bedeutung der Poliomyelitis für die Wehrdienstfähigkeit.

Vergegenwärtigt man sich, daß das Überstehen von Masern Scharlach, Keuchhusten und Diphtherie glücklicherweise in der weitaus größten Zahl der Fälle keine oder nur unwesentliche Schäden hinterläßt, so kann man sich dagegen die Auswirkungen einer überstandenen Poliomyelitis ins Gedächtnis zurück, so wird man im Rahmen dieses Themas die Gegenüberstellung von Mortalität und Morbidität verstehen. Die Mortalität der Poliomyelitis erreicht 1932 zwar fast die Mortalität des Scharlachs, ohne jedoch der Mortalität der Diphtherie auch nur im entferntesten gleichzukommen. Ich glaube in der Annahme nicht fehl zu gehen, daß in den von 1925—1938 gemeldeten und in der Statistik aufgeführten Poliomyelitis-Fällen bei weitem nicht alle Erkrankungen enthalten sind. Diese Annahme gilt insbesondere für die Jahre 1925/26, in denen eine allgemeine Anzeigepflicht nur für das Land Preußen bestand. Aber auch in den folgenden Jahren, in denen das Symptomenbild der Poliomyelitis noch nicht in dem Umfange wie heute Allgemeinwissen des Praktikers war, sind sicherlich eine große Anzahl von Erkrankungen erst nach Manifestation der paralytischen Erscheinungen als Poliomyelitis erkannt und dann z. T. nicht mehr gemeldet worden. Daß auch heute noch der praktische Arzt oder Facharzt bei zweifelhaften Fällen mit der Diagnose Poliomyelitis zurückhaltend ist und zu epidemiefreien Zeiten auch jetzt noch dieser und jener Fall zunächst nicht erkannt wird, ist bei der Verschiedenheit des Symptomenbildes verständlich.

Ferner ist bekannt, daß jene Fälle, die schnell zu Lähmungen der Atemmuskeln führen und anfangs das Symptomenbild einer Affektion der Atemwege boten, mit Pneumonien verwechselt werden, daß meningitische Begleitsymptome die Differentialdiagnose erschweren und zu Fehlschlüssen führen, daß die schnell zum Tode führenden bulbären Formen der Poliomyelitis als Landry'sche Paralyse diagnostiziert werden. Stehen Nasen- und Rachenerscheinungen anfangs im Vordergrund, so ist es bei darauf schnell einsetzenden Atemmuskel- und Gaumensegelähmungen zu dem Fehlschluß gekommen, daß es sich um eine foudroyant verlaufende Diphtherie gehandelt habe. Bekannt sind weiter die zu Beginn häufigen gastro-intestinalen Erscheinungen, die auf Grund ihres Verlaufs (Schleim-, Blut-, Eiterstühle) das Krankheitsbild absolut beherrschen und im Laufe der Erkrankung aufgetretene Lähmungen erst nach Zurücktreten der initialen Symptome bzw. nach beendeter Krankenlager in Erscheinung treten lassen. Müller erwähnt die Verwechslung mit Appendicitis bei Hyperaesthesia des Abdomens mit initialen Darmsymptomen. Gerade die so charakteristische Hyperaesthesia, die sowohl in der Umgebung der Gelenke, als auch im Bereich des Nackens, im Verlauf der Wirbelsäule oder in diesem oder jenem Muskelgebiet besonders hervortreten kann, hat zu Verwechslungen mit Meningitis

itis epidemica, mit Gelenkrheumatismus, Luxationen, Coxitiden, Polyneuritis (besonders bei älteren Patienten) ja sogar zu Verwechslungen mit Frakturen geführt. Auch das Zusammentreffen von Poliomyelitis mit Herpes zoster wurde beobachtet und hat zu entsprechenden Fehlschlüssen Veranlassung gegeben.

Örtliche und allgemeine Muskelhypotonien werden in der Praxis gern mit einfachen Schwächezuständen im Gefolge einer Grippe verwechselt. Zuweilen vorkommende Kopfschmerzen, Schläfrigkeit und Bewußtseinstörung führen zur Diagnose Encephalitis.

Solche und ähnliche Beispiele findet man in genügender Menge aufgeführt und die nicht wenigen Poliomyelitis-Fälle, die rapid zu einem letalen Ausgang führen, werden einer anderen Ursache in die Schuhe geschoben.

Erfahrungsgemäß stellt der Praktiker nur ungern bereits im präparalytischen Stadium die Diagnose Kinderlähmung, die bei den Angehörigen naturgemäß heillosen Schrecken auslöst und, sollte sie sich als Fehldiagnose herausstellen, ihm nicht gerade das Wohlwollen der Beteiligten einbringen dürfte.

Die nicht zu übersehende Fülle von Fehldiagnosen, die dem Erfahrenen wie Unerfahrenen besonders in epidemiefreien Zeiten unterlaufen können, die Hemmung, eine noch nicht sicher zu erkennende Poliomyelitis als solche zu melden und damit bereits vor Manifestwerden der Erkrankung den Eltern das Schreckgespenst vor Augen halten zu müssen, die damit verbundenen Unannehmlichkeiten usw. lassen einmal die Vermutung zu, daß die bisher geführte Statistik sowohl bei den Morbiditäts- als auch bei den Mortalitätsziffern Lücken aufweist und daß andererseits die in der Statistik aufgeführten Fälle zum weitaus größten Teil paralytische sind.

Einen weiteren Anlaß dazu, daß vorstehende Vermutung zu Recht besteht bzw., noch erweitert werden dürfte, geben mir die Ergebnisse der Krüppelzählungen. Im Jahre 1906 zählte man von 100 000 jugendlichen Krüppeln allein 11 000, die ihr Leiden auf eine überstandene Poliomyelitis zurückführten und im Jahre 1925, also rund 15 Jahre nach der ersten deutschen Epidemie wurden nicht weniger als 20 000 schwere und schwerste Krüppel infolge spinaler Kinderlähmung gezählt. Dabei ist zu bedenken, daß hier nur von Krüppeln und zwar von schweren und schwersten die Rede ist. Die Zahlen dürften sich verdoppeln, hätte man auch die weniger schwer Geschädigten und die mit geringen Restzuständen behafteten (leichte Paresen, geringe Schwächen) mitgezählt.

Die in den letzten Jahren in der Literatur zu findenden Angaben über den jährlich zu erwartenden Anfall von Krüppeln schwanken erheblich zwischen 500 und einem Vielfachen hiervon.

Hetsch rechnet beispielsweise mit einem jährlichen Zugang von 600 Krüppeln, einer Zahl, die eher zu niedrig als zu hoch berechnet erscheint.

Seit dem ersten epidemischen Auftreten in Deutschland bis zum Jahre 1925 spielt die Erkrankung bei weiten nicht die Rolle, die ihr bisher seit dieser Zeit beigemessen werden muß. Und trotzdem werden 1925 20 000 Krüppel gezählt. Diese Zahl gibt einen gewissen Anhalt

für die Berechnung der pro Jahr zu erwartenden Krüppel. Da vor den Jahren 1911 und 1909 von Epidemien in Deutschland nicht die Rede ist, muß man annehmen, daß sich die Mehrzahl der 1925 ermittelten Krüppel aus dem Zeitraum 1910—1924 rekrutiert. Innerhalb dieses Zeitechnschnittes fallen also auf jedes Jahr im Durchschnitt 1300 Krüppel. Un-erkannt geblieben sind auf Grund der Tatsache, daß zu jener Zeit die Symptome der Krankheit nicht in dem Maße Allgemeingut der Ärzte waren, wie es heute der Fall ist, sicherlich eine ganze Reihe von Fällen. Ferner waren die Folgen der Erkrankungen zum Teil erheblich stärker bedingt durch unsachmäßige Lagerung der paretischen Gliedmaßen und der sich daraus ergebenden Kontrakturen. Selbst wenn man unter Berücksichtigung der mangelhaften Kenntnis der Erkrankung die Zahl der in dieser Zeit wirklich Erkrankten auf jährlich 2100 ansetzt, was dem jährlichen Durchschnitt der Jahre 1925—1938 gleichkommt, und nur eine Letalität von 10 % annehmen würde, kommt man zu dem Ergebnis, daß über $\frac{2}{3}$ aller Überlebenden zu dauerndem Krüppeltum verdammt wurde.

Ich habe bereits ausgeführt, welche Überlegungen mich dazu veranlaßten, die in den Jahren 1925—1938 angeführten Erkrankungen fast ausnahmslos als paralytische Fälle anzusehen. Die nicht erkannten und unter falscher Diagnose ad exitum gekommenen Poliomyelitis-Fälle, die nicht geringe Zahl der nach beendetem Krankenlager in Erscheinung getretenen Paresen und Schwächen, für deren Zustandekommen nachträglich gern andere Ursachen als gerade die Poliomyelitis angeschuldigt werden und endlich die Unbehandelten und erst wegen irgendeiner Lähmung ärztlicher Behandlung zugeführten Kranken, dürften die der Statistik enthaltenen präparalytischen und Verdachtsfälle bis zum weitem aufheben.

Die Angaben der Kliniken über den Endausgang der Erkrankung getrennt nach geheilten, praktisch geheilten, leichten, mittelschweren und schweren Lähmungen einschließlich der Todesfälle, sind derart verschieden, daß es nicht möglich ist, sie auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Zudem enthalten die klinischer Behandlung zugeführten Fälle in den letzten Jahren ungleich mehr präparalytisch Erkrankte. Die Tatsache verschiebt natürlich die Prozentzahlen gewaltig zugunsten der Geheilten und praktisch Geheilten und führt dazu, den Ausgang der Erkrankung in einem günstigeren Licht erscheinen zu lassen, als es Wirklichkeit der Fall ist.

Mai, dessen kritische Wertung der Heilerfolge anderen Angaben gegenüber auffällt, berichtet über den Endausgang von 333 an Poliomyelitis erkrankten mit und ohne Serum behandelten Kindern. Von diesen 333 Kranken starben 46 d. h. fast 14 %. Heilungen sah er bei 12 Kindern = 12 %. In 43 % der Fälle lautete das Endergebnis schwerer oder mittelschwerer Ausfall bzw. deutliche Parese. Als leichte Schwächen wurden die Folgen der Erkrankung bei 105 Kindern bezeichnet (30 %).

Vorstehende Ergebnisse beziehen sich auf alle wegen Poliomyelitis behandelten Fälle und nicht allein auf solche mit bereits manifesten Lähmungserscheinungen. Die Angaben lassen sich deshalb nur beschränkt auf die statistisch erfaßten und von mir in erster Linie als paralytisch bezeichneten Fälle auswerten.

Es besteht wohl kein Zweifel mehr darüber, daß man die für das ganze Deutsche Reich pro Jahr angegebenen Zahlen jeweils um eine stattliche Summe vermehren müßte, wollte man einen annähernd richtigen Überblick über die Zahl der Erkrankungen seit 1925 gewinnen.

Nach den in Abb. 1 aufgeführten Angaben beträgt die Letalität im Durchschnitt etwas mehr als 10 %, wobei in den ersten 7 Jahren ein etwas höherer Durchschnitt (12,4 %) erreicht wird, als in den folgenden Jahren.

Die Summe der in den 14 Jahren gemeldeten Erkrankungsfälle beträgt fast 30 000. Davon entfallen:

auf die Jahre 1925/26 . . .	1011 (128 St. F.)
„ „ „ 1927/28 . . .	1418 (257 „)
„ „ „ 1929/30 . . .	1260 (145 „)
„ „ „ 1931/32 . . .	2674 (248 „)
„ „ „ 1933/34 . . .	1476 (144 „)
„ „ „ 1935/36 . . .	2177 (182 „)
„ „ „ 1937/38 . . .	4245 (425 „)

In Anlehnung an die von Mai gefundenen Ergebnisse und unter Berücksichtigung meiner Erwägungen über die Lücken der Statistik nehme ich den Endausgang für die vorliegenden Zahlen folgendermaßen an:

Letalität	15 %
schwere Lähmungen	20 %
mittelschwere Lähmungen	25 %
deutliche Lähmungen einzelner Muskelgruppen	20 %
leichte Schwächen	20 %

Die Annahme eines Anfalls von 45 % Krüppeln kommt der Angabe von Hetsch in etwa gleich (2600 Krüppel im Jahr).

Über die Wehrdienstfähigkeit der schweren und mittelschweren Fälle ist nicht zu diskutieren. Wie aber ist die Wehrdienstfähigkeit der mit deutlichen Lähmungen bezeichneten Fälle zu bewerten?

Die Lähmungen treffen bekanntlich in erster Linie die unteren Extremitäten ($\frac{2}{3}$ der Fälle) und dort wieder mit Vorliebe den Tib. ant., den Peronäus und an dritter Stelle den Quadrizeps. Weiter fallen an der oberen Extremität vorzugsweise der Deltoideus, dann der Trizeps, Bizeps, Brachialis, Supinator und schließlich der Pectoralis einer Lähmung anheim. Nicht selten sind auch die Bauch- und Rückenmuskeln beteiligt. Und schließlich kommt es zu Lähmungen des Facialis, Hypoglossus, Abduzens und Okulomotorius. Von evtl. aufgetretenen Kontrakturen bei Lähmungen einer oder mehrerer Muskelgruppen der unteren Extremität abgesehen, kann selbst bei einer isolierten Tibialis, Peronäus oder Quadrizepslähmung von voller Tauglichkeit nicht die Rede sein. Eine Lähmung der Bauch- und in noch stärkerem Maße eine solche der Rückenmuskulatur (errector trunci) muß man bereits zu den mittelschweren, wenn nicht sogar zu den schweren Fällen zählen.

Nicht anders, als bei den Ausfällen gewisser Beinmuskeln verhält es sich bei Lähmungen einer oder mehrerer Muskelgruppen der oberen Extremität.

Ein Ausfall des Deltamuskels oder eine Atrophie des Bizeps, Trizeps oder Brachialis kann bestenfalls mit beschränkter Tauglichkeit bewertet werden.

Schließlich sind Leute mit kompletter Facialisparesie, die im Erwerbsleben mehr störend als schwer empfunden wird, keineswegs als „Volltauglich“ zu bezeichnen. Das gleiche gilt in noch weit höherem Maße für Okulomotorius- und Abduzensparesen.

Für das Erwerbsleben spielen Ausfälle einzelner oder mehrerer Muskelgruppen zum größten Teil nur eine untergeordnete Rolle, weshalb man diese Fälle noch in der Rubrik der praktisch Geheilten auführt. Für das Heer dagegen bedeuten sie einen glatten Ausfall. Es muß sein, daß dieser oder jener als beschränkt tauglich beurteilt werden kann, nie aber wird man sie als voll tauglich bezeichnen können.

Die Vorschrift über militärische Untersuchungen in der Wehrmacht gibt in der Fehlertabelle unter A 17 zur Beurteilung der Fehler, die die Tauglichkeit nicht beeinträchtigen, folgenden Anhaltspunkt. „Unwesentliche die dienstliche Verwendbarkeit in keiner Weise störende Restzustände überstandener Kinderlähmung“. Nicht ohne Absicht wird dem Untersucher die Möglichkeit genommen worden sein, stärkere Restzustände gleicher Genese mit B 17 zu beurteilen. Erst für die Spalten L, U und VU (beschränkt tauglich, untauglich, völlig untauglich) findet man den für die Beurteilung dieser drei Tauglichkeitsgrade gemeinsame Anhaltspunkt: „Chronische Gehirn- und Rückenmarksleiden und Folgezustände (z. B. bleibende Lähmungen nach überstandener Kinderlähmung)“.

Als letzter Punkt ist zu klären, wie die als „leichte Schwächen“ bezeichneten Folgezustände bezüglich der Wehrdienstfähigkeit zu beurteilen sind. Wie bereits erwähnt, ist eine Beurteilung dieser Folgezustände mit bedingter Tauglichkeit nicht möglich. Es besteht also nur die Möglichkeit einer Einstufung unter A oder L 17. Bei diesem sicherlich oft nicht leicht zu treffenden Urteil wird man sich, abgesehen vom Lokalbefund, in erster Linie von dem körperlichen Gesamtzustand und besonders den meist unschwer zu erkennenden mehr oder weniger stark ausgeprägten Wehrwillen des Betreffenden leiten lassen müssen. Ein willensstarker Charakter überwindet die ihm durch seine Fehler erwachsenen Schwierigkeiten, während ein schlapper Kerl, sich täglich auf seine Gebrechen berufend, bald eine untragbare Last für die Truppe wird und daneben eine Gefahr für seine Kameraden bildet.

Natürlich wird man Leute, die Schwächen mehrerer, zumal wichtiger Muskelgruppen aufweisen, in keinem Fall für voll tauglich erklären können. Andererseits wäre es falsch, bei geringem Kraftunterschied der Arme, bei unwesentlicher Schwäche eines Beinmuskels oder leichtem Ausfall der Facialis dem Untersuchten die volle Wehrdienstfähigkeit abzusprechen.

Demnach kann volle Tauglichkeit nur einem Teil der mit Schwächen Behafteten zugesprochen werden. Die Prädisposition für atrophische Lähmungen früherer Poliomyelitis-Kranker und die letzten Ausführungen begründen meine Annahme, daß nur etwa die Hälfte der mit Schwächen Behafteten uneingeschränkte Wehrdienstfähigkeit besitzt.

So kommt man zu dem bedauerlichen und erschreckenden Ergebnis, daß 90 % der bisher gemeldeten Poliomyelitisfälle für die Wehrmacht völlig ausfallen und nur ein geringer Prozentsatz hiervon evtl. beschränkte Tauglichkeit besitzt.

In der 1925 ermittelten Zahl von 20 000 schweren und schwersten Fällen bei den Krüppeln sind die hier besprochenen Gruppen der „deutschen Lähmungen“ und der „geringen Schwächen“ natürlich nicht enthalten. Demnach muß unter Einbeziehung dieser Fälle und unter Berücksichtigung der tödlichen Opfer dieser Seuche die Zahl auf mindestens 30 000 erweitert werden. Die gleiche Summe ergaben die in dem Zeitraum von 1925—1938 angezeigten Fälle, von denen 90 % als nicht voll tauglich für die Wehrmacht bezeichnet werden müssen.

Wir haben also in den letzten 14 Jahren einen Verlust für das Heer von 27 000 Menschen zu verzeichnen. Der Gesamtausfall der Jahrgänge 1909—1938 erreicht aber mehr als das Doppelte.

Da das männliche Geschlecht häufiger erkrankt als das weibliche — das Verhältnis wird mit 60:40 angegeben — beläuft sich der Verlust an Knaben unter Zugrundelegung eines Gesamtausfalles von 60 000 Menschen auf 36 000.

Der auf die einzelnen Jahre entfallende Ausfall ist natürlich sehr verschieden: im Durchschnitt beträgt er 1200 Knaben. Somit verlieren wir im Jahr 1928 1530, im Jahre 1932 bereits 2116 Knaben und das Jahr 1938 hat einen Verlust von über 3000 Knaben zu verzeichnen. Diese Zahlen bedeuten aber nicht nur einen Ausfall für die Wehrmacht, sondern fast im gleichen Maße auch für den Arbeitsdienst.

Ein großer Teil besitzt nur beschränkte Arbeitsfähigkeit und eine nicht geringe Anzahl ist erwerbsunfähig und fällt der Fürsorge anheim.

Die dem Staate hieraus erwachsenen Kosten spielen gegenüber dem Ausfall an Arbeitskräften nur eine unbedeutende Rolle. In einer Zeit größten Einsatzes aller verfügbaren Arbeitskräfte kommt dem Verlust an Frauen eine nicht minder wichtige Bedeutung zu. Die Lücken machen sich in Kriegszeiten doppelt bemerkbar, wo die Frau an der Front und in der Heimat im Dienste des Vaterlandes steht. Ganz gleich, an welcher Stelle sie eingesetzt ist, große Leistungen werden verlangt, für deren Erfüllung gesunde Menschen erforderlich sind.

So erleidet die Wehrmacht auch durch den Ausfall der Frauen einen weiteren, wenn nicht direkten, so doch indirekten Verlust in Friedens- wie in Kriegszeiten.

Die Mortalität von Scharlach, Masern und Keuchhusten tritt gegenüber der Morbidität der Poliomyelitis weit in den Hintergrund. Steigt die Morbidität der Poliomyelitis mit gleicher Gesetzmäßigkeit weiter, so erreicht sie in absehbarer Zeit die Bedeutung der Diphtherie, die seit 1926 dem Verlauf der Poliomyelitis-Kurve gleichend wieder einen erheblichen Anstieg zu verzeichnen hat.

Dem bisherigen Verlauf der Poliomyelitis-Kurve nach zu urteilen, ist mit einem weiteren Steigen der Poliomyelitis in den folgenden Jahren zu rechnen. Diese Vermutung wiegt doppelt schwer, da die heutige Therapie und Prophylaxe uns nicht in die Lage versetzen, der Seuche erfolgreich zu begegnen.

Schrifttum.

- v. Bergmann-Staehelin: Handbuch der inneren Medizin.
- Bieling: Entstehung und biologische Bekämpfung typischer Infektionskrankheiten. Joh. Ambr. Barth, Leipzig 1937.
- Gundel, Max: Die ansteckenden Krankheiten. Georg Thieme, Leipzig 1935.
- Gottstein: Die Lehre von den Epidemien. Jul. Springer, Berlin 1929.
- Kolle-Hetsch: Experimentelle Bakteriologie und Infektionskrankheiten. 8. Aufl. Urban und Schwarzenberg, Berlin 1938.
- Mai, H.: Veröffentlichungen aus dem Gebiet des Volksgesundheitsdienstes. Heft 5, 53 ff.
- Mai, H.: Münch. med. Wschr. 1938, 393.
- Müller, H.: Münch. med. Wschr. 1938, 353.
- Opitz, H.: Kinderärztl. Prax. 1938, 203 und 248.
- Paul, R.: Münch. med. Wschr. 1938, 430.
- Pette, H.: Med. Welt, 1939, 71.
- Pfaundler, M.: Münch. med. Wschr. 1938, 425.
- Rudder, P. de: Grundriß einer Meteorologie des Menschen. Jul. Springer, Berlin 1938.
- Seiffert, G.: Virus und Viruskrankheiten bei Menschen, Tieren und Pflanzen. Theod. Steinkopf, Dresden und Leipzig.
- Wolter, F.: Klin. Wschr. 1938, 1226.
- Kleinschmidt, H.: Die übertragbare Kinderlähmung. S. Hirzel, Leipzig 1939.

Lebenslauf.

Am 20. November 1909 wurde ich in Moers als Sohn des Verwaltungsdirektors Felix und seiner Ehefrau Emma, geb. Gries, geboren. Nach Besuch der Volksschule und des Gymnasiums in Moers legte ich 1929 die Reifeprüfung ab. Vorklinisch hörte ich in Berlin und Würzburg, wo ich das Vorexamen ablegte. Anschließend studierte ich in Freiburg, Florenz und Düsseldorf und habe dort 1935 das medizinische Staatsexamen mit „sehr gut“ bestanden.

Nachdem ich drei Monate als Medizinalpraktikant an der städtischen Frauenklinik in Duisburg tätig war, trat ich am 1. 11. 1935 in die Wehrmacht ein und vollendete den Rest des praktischen Jahres am Standortlazarett in Halberstadt. Am 1. 2. 1937 erhielt ich meine Beurlaubung als Arzt. Im November 1938 wurde ich als Adjutant zum Stabe der 31. Division versetzt, habe bei dieser Einheit den Polenfeldzug mitgemacht und wurde am 1. 11. 1939 zum Stabsarzt befördert.

Hans Felix.

Erkrankungen an spinaler Kinderlähmung auf 100 000 der Bevölkerung.

	Bev.-Dichte pro qkm	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938
Preußen	136	0,5	3,0	3,9	1,6	2,2	1,8	2,1	6,5	2,4	3,0	2,7	3,9	3,4	6,3
Gumbinnen	58	0,2	0,7	2,0	4,6	2,0	0,7	1,3	1,5	1,4	0,6	1,8	0,6	3,1	1,1
Königsberg	73	0,2	1,3	5,9	4,3	2,4	2,9	1,7	3,0	0,8	1,5	1,9	1,9	2,4	0,5
Allenstein	48	0,6	3,8	6,2	4,7	6,0	4,5	1,4	2,3	4,9	3,8	3,6	1,5	2,0	0,4
Westpreußen	95	0,8	0,4	9,4	1,5	2,6	6,0	1,9	7,0	0,7	1,4	0,7	4,7	1,1	0,7
Berlin	4801	0,8	2,9	2,2	1,6	1,6	0,9	0,8	4,5	4,8	1,8	1,3	2,3	10,6	3,4
Potsdam	71	0,2	3,2	4,7	1,4	1,3	1,9	0,6	9,0	2,0	1,8	1,4	2,9	6,9	5,4
Frankfurt	68	0,3	2,4	3,5	1,6	0,9	0,8	0,5	9,9	2,6	1,8	0,2	2,0	4,3	8,7
Stettin	76	0,5	2,7	2,5	2,0	1,5	1,0	0,3	23,5	3,5	1,4	1,2	1,0	8,2	6,3
Köslin	49	1,0	1,6	0,3	0,7	1,0	2,1	0,7	11,0	15,0	2,2	4,0	4,2	3,5	10,8
Schneidemühl	44	0,3	2,1	1,5	1,8	5,0	2,1	2,0	21,3	6,8	8,0	3,6	2,7	5,4	6,5
Oppeln	153	0,2	0,5	0,9	1,0	0,8	0,7	3,1	2,6	1,4	1,0	1,8	6,9	2,0	0,7
Breslau	152	0,5	1,2	2,0	1,8	1,5	0,5	0,3	11,0	1,9	3,5	7,6	5,6	3,2	3,7
Liegnitz	91	0,2	2,1	1,4	1,4	0,7	0,6	1,2	3,6	1,9	0,9	4,1	12,6	1,1	2,9
Magdeburg	113	0,6	5,9	7,8	0,5	1,2	1,3	1,1	16,6	0,5	0,6	0,3	3,0	1,5	3,5
Merseburg	146	0,5	3,5	18,4	0,8	1,0	1,0	0,5	8,1	1,1	0,5	0,9	1,3	3,4	5,0
Erfurt	164	0,4	15,7	5,9	1,2	0,3	1,9	1,0	13,0	1,1	1,3	5,2	4,6	3,0	4,6
Schleswig	106	0,6	3,9	3,9	3,6	3,5	1,4	5,8	5,3	2,2	7,1	6,7	1,8	2,4	1,6
Stade	69	0,2	1,5	1,5	3,0	1,3	1,1		5,5	0,8	4,7	3,2	7,5	0,4	2,6
Lüneburg	55	0,5	5,0	2,2	1,3	13,2	1,6	1,6	3,7	0,2	2,3	6,6	5,8	1,3	2,2
Hannover	145		7,8	2,5	1,3	2,9	2,1	0,9	15,1	0,6	2,7	1,7	10,9	1,0	1,3
Hildesheim	117	1,2	4,4	2,0	1,3	2,0	1,7	0,5	16,7	0,8	1,8	1,3	2,9	1,0	6,2
Aurich	100	1,0	1,7	4,1	2,3	1,7	0,7	1,6	5,2	7,1	2,3	3,2	1,3	2,3	0,6
Osnabrück	75		0,9	1,1	1,8	9,0	0,9	2,6	3,2	0,9	2,4	5,8	0,6	0,2	1,9
Münster	214	1,1	2,3	3,6	1,6	1,7	2,3	4,5	3,7	1,7	14,3	3,1	4,0	1,3	2,6
Minden	166	0,3	2,0	3,5	1,3	1,3	1,5	8,0	3,3	2,0	1,4	3,8	2,4	0,7	0,9
Arnsberg	341	0,8	3,5	5,7	1,9	1,8	2,8	7,0	4,3	2,1	4,5	2,9	6,3	2,0	2,1
Kassel	106	0,8	3,6	6,8	1,6	1,8	1,1	1,4	6,5	1,3	0,6	1,0	7,5	1,8	8,0
Wiesbaden	241	0,7	1,8	3,7	1,3	1,5	0,7	3,6	4,3	1,1	2,6	1,6	1,3	2,4	16,4
Düsseldorf	742	0,3	3,3	2,6	0,7	4,3	2,5	2,0	2,6	2,1	3,6	2,7	3,4	1,8	5,7
Aachen	239	0,6	2,9	4,0	0,7	3,4	1,5	1,8	2,4	2,8	1,9	1,1	5,7	1,3	6,0
Köln	388	0,9	2,6	3,5	1,9	1,2	4,0	0,5	3,5	1,7	2,7	3,2	5,7	3,0	47,8
Koblenz	134	0,4	2,4	1,6	1,2	0,9	4,9	0,5	1,7	0,8	3,3	3,9	1,4	1,1	16,5

	64	1,4	1,4	5,5	1,5	1,4	2,8	5,7	4,2	1,3	1,5	5,5	11,0	2,7	10,8
Stegmaringen															
Bayern	101	1,2	0,7	4,3	1,5	1,2	3,1	5,7	4,2	1,3	1,5	5,5	2,6	13,5	12,4
Ober-Bayern	107	1,2	0,4	1,4	1,1	0,9	1,4	12,7	5,8	1,2	1,7	1,7	2,5	5,1	10,7
Niederbayern-Ober-Pfalz	70	0,2	0,2	3,2	1,8	1,1	2,6	5,2	4,2	2,0	1,4	1,4	1,4	3,3	7,0
Ober-Mittel-Franken	124	1,5	0,9	8,3	1,3	0,7	1,3	5,1	4,1	0,6	1,3	1,3	3,0	0,7	3,3
Unterfranken	94	3,9	1,8	7,8	0,9	1,0	3,9	3,7	1,3	0,4	1,3	1,3	2,5	1,6	26,5
Schwaben	89	1,1		4,8	4,1	2,7	3,0	1,7	3,1	1,4	3,2	3,2	3,5	3,4	26,4
Pfalz	179	0,2	1,1	0,3	0,4	1,5	10,0	0,8	4,8	2,5	0,4	0,4	3,0	1,0	7,7
Sachsen	347	0,5	2,1	11,6	2,1	1,3	1,7	0,5	5,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	2,3
Leipzig	384	0,5	1,9	28,6	1,4	1,5	2,6	0,6	9,4	1,8	1,0	1,0	1,8	1,1	2,6
Dresden-Bautzen	281	0,7	1,3	3,4	4,5	1,7	1,2	0,5	1,7	1,5	1,4	1,4	1,6	2,8	2,9
Chemnitz	502	0,4	3,5	8,2	1,3	0,9	2,4	0,7	8,2	1,3	2,9	2,9	1,1	0,3	23,8
Zwickau	345	0,4	3,0	3,5	0,8	1,1	0,8	0,4	2,3	0,1	0,3	0,3	0,9	0,6	1,0
Württemberg	138	0,6	1,8	2,8	0,8	1,0	1,0	2,2	1,4	0,5	1,4	1,4	12,1	1,6	1,7
Baden	160	1,3	0,8	2,3	0,9	1,1	8,2	5,4	1,1	1,0	4,4	4,4	4,6	3,1	2,3
Thüringen	141	0,4	3,9	9,0	1,2	1,0	1,8	0,9	5,3	0,7	0,7	0,7	2,0	2,1	1,7
Hessen	186	0,9	2,6	2,6	0,9	1,6	3,1	1,2	4,5	0,5	0,8	0,8	2,3	2,9	11,5
Hamburg	2936	0,9	4,7	2,1	3,5	1,3	0,7	2,4	8,0	1,6	4,5	4,5	3,9	1,0	2,3
Mecklenburg	50	0,6	2,6	1,1	1,2	2,1	2,9	2,6	16,0	2,2	9,7	9,7	6,3	4,2	1,7
Lübeck	458	0,8	8,6	0,8	6,8	1,5	1,5	0,7	3,1	0,7	2,9	2,9	14,0	0,7	0,7
Oldenburg	89				1,8	0,4	1,1	6,5	8,5	1,7	0,3	0,3	8,4	5,6	2,1
Bremen	1441			4,1	0,6	0,9	0,9	4,3	18,7	1,3	4,0	4,0	1,9	26,0	0,5
Braunschweig	140		3,6	6,6		2,4	1,0	1,2	8,0	1,8	0,2	0,2	3,7	5,5	1,0
Anhalt	158					0,3	0,8	0,8	3,3	1,1	0,6	0,6	1,7	1,4	2,5
Lippe	145	0,6	0,6	1,2		1,2	7,7	1,2	4,1	6,2	6,2	6,2	5,1	0,6	1,1
Schaumburg-Lippe	147							2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	14,0	0,9	0,7
Saarland	424												1,2	0,9	16,9
Deutsches Reich Todesfälle	140	0,7	2,7	4,5	1,6	1,8	2,1	2,5	5,8	1,9	2,6	2,6	3,2	3,4	4,1

Erkrankungen an spinaler Kinderlähmung auf 10 000 Kinder im Alter von 0—10 Jahren.

	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	Durchschnitt 25—38
Preußen	0,3	1,9	2,4	1,0	1,4	1,1	1,3	4,1	1,5	1,8	1,7	2,5	2,1	4,0	1,9
Gumbinnen	0,1	0,8	1,1	2,5	1,1	0,4	0,7	0,8	0,8	0,3	1,0	0,3	1,8	0,6	0,9
Königsberg	0,1	0,5	3,0	2,2	1,2	1,5	0,9	1,6	0,45	0,8	1,0	1,0	1,3	0,3	1,1
Allenstein	0,25	0,2	2,8	2,2	2,7	2,1	0,7	1,1	2,2	1,7	1,6	0,7	0,9	0,16	1,4
Westpreußen	0,37	1,5	4,7	0,7	1,3	3,0	0,9	3,6	0,37	0,7	0,37	2,4	0,5	0,37	1,5
Berlin	0,8	3,0	2,4	1,7	1,8	1,0	9,0	5,0	5,0	2,0	1,5	2,5	12,0	4,0	3,7
Potsdam	0,1	2,0	3,0	0,9	0,7	1,2	0,4	6,0	1,4	1,2	1,0	2,0	5,0	4,0	2,0
Frankfurt	0,2	2,0	2,2	1,0	0,6	0,5	0,3	6,3	1,6	1,1	0,1	1,3	2,8	5,6	1,7
Stettin	0,3	1,8	1,4	1,1	0,9	0,6	0,2	14,0	2,1	0,8	0,7	0,6	4,9	3,8	2,4
Köslin	0,5	1,3	0,16	0,4	0,5	1,2	0,4	6,3	8,0	1,2	2,1	2,3	1,9	6,0	2,3
Schneidemühl	0,15	1,0	0,8	0,9	2,6	1,0	1,0	11,0	3,6	4,0	1,9	1,3	2,6	3,5	2,5
Oppeln	0,09	0,3	0,4	0,4	0,38	0,3	1,4	1,2	0,6	0,47	0,8	3,2	0,9	0,3	0,7
Breslau	0,27	0,9	1,2	1,0	0,8	0,27	0,18	6,7	1,1	2,0	4,6	3,0	1,9	2,2	1,8
Liegnitz	0,09	1,2	0,8	0,8	0,4	0,38	0,7	2,2	1,1	0,5	2,4	7,6	0,67	1,7	1,5
Magdeburg	0,4	4,0	5,3	0,3	0,8	0,9	0,7	11,0	0,3	0,4	0,21	2,1	1,0	2,4	2,1
Merseburg	0,3	2,0	11,0	0,4	0,56	0,56	0,28	4,8	0,7	0,3	0,56	0,76	2,0	3,0	2,0
Erfurt	0,2	9,0	3,5	0,7	0,2	1,1	0,6	8,2	0,7	0,8	3,3	3,0	1,8	3,0	2,5
Schleswig	0,37	2,6	2,5	2,3	2,2	0,9	3,7	3,4	1,4	4,7	4,4	1,1	1,5	1,0	2,3
Stade	0,1	1,1	0,9	1,7	0,76	0,65	—	3,3	0,51	2,8	1,9	4,4	0,25	1,5	1,4
Lüneburg	0,3	3,6	1,3	0,8	8,0	1,0	1,0	2,3	0,1	1,4	4,1	3,6	0,8	1,4	2,0
Hannover	—	5,9	1,8	0,9	2,0	1,5	0,6	10,0	0,4	2,0	1,2	8,2	0,7	1,0	2,2
Hildesheim	0,7	3,2	1,2	0,8	1,2	1,0	0,3	10,0	0,5	1,1	0,8	1,7	0,6	4,0	2,0
Aurich	0,5	0,8	1,9	1,1	0,8	0,32	0,8	2,6	3,6	1,1	1,6	0,65	1,1	0,32	1,2
Osnabrück	—	0,55	0,55	0,88	4,4	0,44	1,3	1,5	0,44	1,2	3,0	0,33	0,1	0,99	1,1
Münster	0,45	0,84	1,5	0,7	0,74	1,0	2,0	1,6	0,87	7,2	1,5	2,0	0,65	1,3	1,6
Minden	0,13	1,2	1,9	0,75	0,75	0,88	4,6	2,0	1,1	0,82	2,2	1,3	0,41	0,5	1,3
Arnsberg	0,5	2,2	3,7	1,2	1,2	1,8	4,8	2,9	1,2	2,7	1,7	3,8	1,2	1,2	2,1
Kassel	0,47	2,4	4,2	1,0	1,1	0,69	0,9	4,1	0,79	0,37	0,58	4,5	1,1	5,0	1,9
Wiesbaden	0,46	1,2	2,5	0,87	1,0	0,46	2,4	2,9	0,82	1,9	1,1	0,96	1,7	12,0	2,1
Düsseldorf	0,21	2,0	1,6	0,46	2,7	1,6	1,3	1,6	1,4	2,4	1,8	2,2	1,2	3,7	1,7
Aachen	0,31	1,8	2,1	0,38	1,8	0,8	1,0	1,3	1,7	1,0	0,62	3,3	1,77	3,4	1,4

Köln Trier Sigmaringen	0,22 0,31 0,8	1,3 0,6 0,8	1,0 0,5 3,2	0,7 0,3 —	0,53 0,42 0,8	3,0 1,7 1,6	0,3 0,2 —	1,0 0,42 0,8	0,45 0,73 —	1,9 0,2 3,2	2,2 2,0 6,0	0,84 0,73 —	0,6 0,78 1,6	9,0 0,42 6,0	1,6 0,7 1,8
Bayern	0,69	0,45	2,4	0,87	0,69	1,8	3,4	2,5	0,78	0,9	1,5	1,5	8,0	7,4	2,3
Oberbayern	0,78	0,27	8,8	0,7	0,6	0,93	8,0	4,0	0,86	1,2	1,7	3,5	29,0	7,4	4,8
Niederbayern-Ober-Pfalz	0,1	0,17	1,5	0,87	0,52	1,2	2,5	2,0	0,97	0,7	0,7	1,6	4,7	3,5	1,5
Ober-Mittel-Franken	0,87	0,6	5,0	0,83	0,4	0,8	3,0	2,6	0,38	0,88	1,9	0,41	2,0	5,0	1,7
Unterfranken	2,0	0,6	4,1	0,48	0,55	2,1	2,0	0,6	0,2	0,6	1,3	0,9	0,9	14,0	2,1
Schwaben	0,65	0,5	2,9	2,5	1,6	1,8	1,0	1,9	0,8	2,0	2,2	2,1	4,8	16,0	3,0
Pfalz	0,1	0,6	0,17	0,22	0,8	5,3	0,44	2,6	1,4	0,22	1,7	0,57	0,8	1,0	1,1
Sachsen	0,33	1,5	8,6	1,5	0,97	1,2	0,38	3,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,8	7,3	2,3
Leipzig	0,4	1,4	21,0	1,0	1,1	2,0	0,45	7,0	1,4	0,79	1,4	0,84	2,0	7,7	3,4
Dresden-Bautzen	0,37	0,9	4,0	2,7	1,1	0,8	0,33	1,6	1,2	1,1	1,2	2,3	2,3	3,2	1,7
Chemnitz	0,27	2,3	5,5	0,9	0,6	1,6	0,48	5,7	0,96	2,0	0,75	0,2	1,5	16,0	2,8
Zwickau	0,26	2,2	2,6	0,61	0,78	0,61	0,26	1,7	0,08	0,26	0,69	0,43	0,78	4,0	1,0
Württemberg	0,35	0,18	1,7	0,5	0,59	0,6	1,3	0,9	0,32	0,9	7,7	1,0	1,2	21,0	2,7
Baden	0,73	0,43	1,3	0,5	0,63	4,9	3,2	0,68	0,63	2,6	2,8	1,9	1,3	9,0	2,1
Thüringen	0,23	2,4	5,7	0,77	0,66	1,1	0,58	3,4	0,46	0,46	1,3	1,3	1,0	4,0	1,7
Hessen	0,54	1,3	1,5	0,54	0,99	1,9	0,72	2,8	0,31	0,54	1,4	1,8	1,3	7,0	1,6
Hamburg	0,73	3,5	1,8	3,0	1,0	0,65	2,1	7,1	1,3	4,0	3,5	0,87	2,0	4,0	2,5
Mecklenburg	0,31	1,5	0,7	0,86	1,0	1,5	1,4	4,7	1,4	6,0	4,0	2,6	1,2	1,2	2,0
Lübeck	0,55	10,0	0,55	5,0	1,1	1,1	0,55	3,3	0,55	2,2	10,0	—	0,55	—	2,5
Oldenburg	—	—	—	0,93	0,18	0,56	3,4	4,6	0,93	0,18	4,4	2,9	1,1	0,4	1,4
Bremen	—	—	3,0	0,42	0,64	0,64	3,2	14,0	1,0	3,2	1,5	21,0	0,42	3,0	3,7
Braunschweig	—	2,5	4,3	—	1,6	0,7	0,83	5,7	1,2	0,14	2,6	3,9	0,7	1,0	1,8
Anhalt	—	1,0	2,3	—	0,18	0,53	0,18	2,1	0,71	0,35	1,0	0,9	1,6	2,0	0,9
Lippe	0,35	0,35	0,7	—	0,7	4,9	0,7	2,4	3,8	3,8	3,1	0,35	0,7	1,0	1,6
Schaumburg-Lippe	5,7	—	—	—	—	—	1,4	1,4	1,4	1,4	—	10,0	—	1,4	1,6
Saarland							0,69	0,55	0,41	9,0	2,2	2,7	5,7	2,7	2,0
Deutsches Reich	0,39	1,6	2,8	0,98	1,1	1,35	1,59	3,7	1,2	1,68	2,0	2,2	2,7	5,7	2,0